

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПАНТОВИГАР

Регистрационный номер: ЛСР-000045 от 13.04.2007

Торговое наименование: Пантовигар

Группировочное наименование: Поливитамины+Прочие препараты

Лекарственная форма: капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Действующие вещества:

Дрожжи медицинские	100 мг
Тиамин мононитрат	60 мг
Кальция пантотенат	60 мг
Цистин	20 мг
пара-Аминобензойная кислота	20 мг
Кератин	20 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, повидон, кремния диоксид коллоидный.

Оболочка капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, индигодин.

Описание

Твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы – темно-зеленого цвета, корпус – цвета слоновой кости. Содержимое капсулы – бежево-коричневатый порошок с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

Поливитаминовое средство + прочие препараты

Код АТХ: А11ЈС

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пантовигар содержит необходимые для волос и ногтей элементы. Свойства препарата обусловлены свойствами, входящих в его состав компонентов.

Фармакокинетика

Исследований фармакокинетики препарата не проводили. Витамины препарата всасываются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Компоненты аминокислот, полученные в результате гидролиза кератина (цистина и пара-аминобензойной кислоты), всасываются путем пассивной диффузии и/или при участии определенных транспортных систем.

Показания к применению

Диффузное выпадение волос негормональной этиологии.

Дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнечным и ультрафиолетовым излучением).

Нарушение структуры ногтей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам препарат назначается врачом в случае, когда польза для матери превышает риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Взрослые: 3 раза в день по 1 капсуле внутрь, во время еды, не разжевывая с небольшим количеством жидкости. Средняя продолжительность лечения составляет 3-6 месяцев.

По необходимости лечение может быть продолжено или повторено.

Побочное действие

Побочные реакции классифицируются по частоте встречаемости следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (в настоящее время данные о распространенности побочных реакций отсутствуют).

Нарушения со стороны нервной системы: частота неизвестна: головная боль и головокружение.

Нарушения со стороны сердца: редко: тахикардия, учащение пульса; частота неизвестна: сердцебиение.

Желудочно-кишечные нарушения: частота неизвестна: диарея, рвота, боль в животе, метеоризм, изжога, тошнота.

Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко: крапивница, сыпь, зуд; частота неизвестна: покраснение.

Общие нарушения и реакции в месте введения: редко: повышенное потоотделение.

Передозировка

Симптомов передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Если Вы одновременно принимаете сульфаниламидные препараты, Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, можно ли Вам принимать Пантовигар и как его принимать.

Особые указания

Инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может использоваться в составе комбинированной терапии.

Так как формирование волос – это длительный процесс, важно принимать препарат в указанных дозировках регулярно в течение 3-6 месяцев. Если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо обратиться к врачу, так как эти заболевания могут быть признаками общих заболеваний.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Капсулы.

По 15 капсул помещают в блистер из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой. По 6 или 10 блистеров помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. По 2 картонных пачки, содержащих по 10 блистеров, упакованы в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не использовать по окончании срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производство готовой лекарственной формы/Производитель (Выпускающий контроль качества)

«Ацино Фарма АГ», Швейцария, 4253 Лисберг, Бирсвег, 2.

Первичная упаковка/Вторичная (потребительская) упаковка

«Ацино Фарма АГ», Швейцария, 4147 Эш, Пфеффингерринг, 205.

Владелец регистрационного удостоверения:

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», Германия 60318 Франкфурт-на-Майне, Экенхаймер Ландштрассе, 100.

Претензии направлять по адресу:

ООО «Мерц Фарма»

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10,

Башня на Набережной, блок С.

телефон: (495) 653-8555

www.merz.ru